

ADVARSLER

Må ikke anvendes til patienter med kendte methacrylat-allergier. Uherdet methacrylat-resin kan give allergi ved hudkontakt og beskadige pulpa. OptiBond Universal-adhesive indeholder acetone og er brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. OptiBond Universal er en korrosiv væske. Gel Etchant er en øtende syre - indeholder fosforsyre. Undgå kontakt med hud, øjne og væv. Kontakt med hud eller øje skal der omgående skyldes grundigt med vand. Søg lægehelb på ejekontakt. Må ikke indtages.

SIKKERHEDSFORSTALTNINGER

Nedlægs effektiviteten mellem 2 og 4 %. Flasken med OptiBond Universal-adhesive skal lukkes tæt i midtfladen efter brug. OptiBond Universal-adhesive er et lysherdet materiale. Når materialet er anbragt i en blandekop, skal det omgående anvendes eller beskydes mod omgivende væske.

Sprøjte til øtgesk: Tryk aldrig på hærdet på sprettempletet, for at dispensere øtgesmidsel, da det kan medføre, at der dispenseres for meget materiale. Hvis der markes modstand, skal den aktuelle spids udskiftes med en ny spids, og fluet skal kontrolleres ekstraft.

UTILSIGTEDE REAKTIONER

Ingen kendte.

BRUGSANVISNING

Step-by-step anvisning

Direkte restaureringer

Bonding komposit-/componer-materiale til dentin/ensilage
1. Klargør vævetten. Skyl grundigt med tre-funktionssprøjte, og lad luftstrøm (må ikke udtræde).

Til selvstændigsteknikken udelades trin 2-3, og der fortsættes til trin 4.

Til selektiv emaljeætsningsteknik
2. A - Æts emaljenærminger med et fosforsyre-ætsel (feks. Kerr's 37,5 % ætsel) i 15 sekunder, og skyl så grundigt for at sikre, at alt ætsel er blevet fjernet. Fortsæt til trin 3.

Til Total æts teknik
2. B - Æts emalje- og dentinkavitetsoverflader med et fosforsyre-ætsel (feks. Kerr's 37,5 % ætsel) i 15 sekunder, og skyl så grundigt for at sikre, at alt ætsel er blevet fjernet. Fortsæt til trin 3.

3. Luftstrøm, let ikke udtræde.

4. Ryst kraft flasken med OptiBond Universal-adhesive.

Bemærk: Ved første bruk skal flasken med OptiBond Universal-adhesive rystes energisk i 10 sekunder.

5. **Ved bruk av flask:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

Ved bruk av Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-kapslen, og sæt børsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsborsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentalvenedsl. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

9. Aplicerer komposit i henhold til producentens brugsanvisning.

Indirekte restaureringer

(Se de indikationsspecifik oplysninger i afsnit A-D nedenfor):

Iklaring af restaureringsoverfladen: Keramiske/porcelænsrestaureringer:
Sandblæs overfladen med 50 µ aluminiumpul med et tryk på 0,2 MPa, og æts restaureringens indvendige overflade, brug først let luft og dæftere kraftig luft til at gøre laget tyndere for at undgå, at OptiBond Universal-adhesive samler sig, og lyshærdet i 10 sekunder* (lyshærdning af OptiBond Universal-adhesive er valgfrit, hvis NX3-resinemidet anvendes til cementering).

*Alternativt påføres et lag Kerr silan på restaureringens indvendige overflade og gører tyndere med let luft. Beskyt restaureringen mod lys, da Kerr silan indeholder resor og er lysfølsom.

Metallbaserede, zirkonbaserede, aluminabaserede og kompositrestaureringer:
Sandblæs den indvendige overflade med 50 µ alumina med et tryk på 0,4 MPa til metallrestaureringen, zirkonbaserede og aluminabaserede restaureringer eller et tryk på 0,1 MPa til kompositrestaureringen. Pøler og lag OptiBond Universal-adhesive på restaureringens indvendige overflade, brug først let luft og dæftere kraftig luft til at gøre laget tyndere for at undgå, at OptiBond Universal-adhesive samler sig, og lyshærdet i 10 sekunder* (lyshærdning af OptiBond Universal-adhesive er valgfrit, hvis NX3-resinemidet anvendes til cementering).

II. Preparation af tandg - tilvenning
1. Rengør klargøringen. Vask grundigt med vandsprøjte, og luftstrøm (må ikke udtræde).

Til selvstændigsteknikken udelades trin 2-3, og der fortsættes til trin 4.

Til selektiv emaljeætsningsteknik
2. A - Æts emaljenærminger med et fosforsyre-ætsel (feks. Kerr's 37,5 % gel ætsel) i 15 sekunder, og skyl så grundigt for at sikre, at alt ætsningsmidet er blevet fjernet. Fortsæt til trin 3.

3. Luftstrøm, let ikke udtræde.

4. Ryst kraft flasken med OptiBond Universal-adhesive.

Bemærk: Ved første bruk skal flasken med OptiBond Universal-adhesive rystes energisk i 10 sekunder.

5. **Applikering af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

Appliquer af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

III. Placering/ætsning af restaurering

A. **Facerad:** Aplicér luttingen til facaden, placer facaden, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

B. **Kroner, broer, indtag, onlays og metallbaserede restaureringer:** Undgå, at adhesivet samler sig under lyshærdning. Efter lyshærdning af adhesivet pøler og lutingen (den vigtige bemærkning nedenfor for cementering) til restaureringen eller klargøringen, placer restaureringen, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

Vigtig bemærkning: Vigtig bemærkning: Kerr anbefaler brugen af NX3, Maxcem elite, eller Maxem Elite Chroma resin cement når der er ingen eller lidt lystlighedsfælighed (feks. metal baserede, zirkon baserede aluminabaserede substrater).

C. **Stifter - Påfør adhesiv på stift og klargør.** Undgå, at adhesivet samler sig under lyshærdning. Fjern overskydende adhesiv med en tor borste eller absorberende papir. Efter lyshærdning af adhesivet pøler og lutingen (den vigtige bemærkning nedenfor for cementering) til restaureringen eller klargøringen, placere restaureringen, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

D. **Applikation af Unidose:** Samme som ovenstående.

E. **Lyshærdning:** Fjern overskydende adhesiv med en tor borste eller absorberende papir. Efter lyshærdning af adhesivet pøler og lutingen (den vigtige bemærkning nedenfor for cementering) til restaureringen eller klargøringen, placere restaureringen, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

F. **Lyshærdning i 10 sekunder:** Lyshærdet i 10 sekunder.

IV. Placering/ætsning af restaurering

G. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

H. **Appliquer komposit enligt tillverkernes brugsanvisning.**

Indirekte restaureringer

(Se indikationsspecifik information i avsnitt A-D nedan):

Polymerisering af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

III. Placering/ætsning af restaurering

A. **Facerad:** Aplicér luttingen til facaden, placer facaden, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

B. **Kroner, broer, indtag, onlays og metallbaserede restaureringer:** Undgå, at adhesivet samler sig under lyshærdning. Efter lyshærdning af adhesivet pøler og lutingen (den vigtige bemærkning nedenfor for cementering) til restaureringen eller klargøringen, placere restaureringen, og hærd cementen i henhold til producentens brugsanvisning.

C. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

D. **Appliquer komposit enligt tillverkernes brugsanvisning.**

Indirekte restaureringer

(Se indikationsspecifik information i avsnitt A-D nedan):

Polymerisering af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

IV. Placering/ætsning af restaurering

G. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

H. **Appliquer komposit enligt tillverkernes brugsanvisning.**

Indirekte restaureringer

(Se indikationsspecifik information i avsnitt A-D nedan):

Polymerisering af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

IV. Placering/ætsning af restaurering

G. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

H. **Appliquer komposit enligt tillverkernes brugsanvisning.**

Indirekte restaureringer

(Se indikationsspecifik information i avsnitt A-D nedan):

Polymerisering af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

IV. Placering/ætsning af restaurering

G. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samgående hættet på igennem efter dispensering.

H. **Appliquer komposit enligt tillverkernes brugsanvisning.**

Indirekte restaureringer

(Se indikationsspecifik information i avsnitt A-D nedan):

Polymerisering af Unidose™

Kun bereget til anvendelse på én patient: Åbn Unidose-enheten, og sæt applikatorbørsten i beholderen for at gennemvæde spidsen.

6. Med engangsapplikatorbørsten anvendes en rigelig mængde OptiBond Universal-adhesive til emalje-/dentinkavitetsoverflader. Skrub overfladen med en borstebegævelse i 20 sekunder.

7. Fortsæt kraftslis med let luft og dæftere middel luft i mindst 5 sekunder med oliefri luft. Overfladen bør have et blankt, ensartet udseende. Hvis ikke, gentages trin 6 og 7.

8. Lyshærdet i 10 sekunder.*

IV. Placering/ætsning af restaurering

G. **Applikation af flaskens indhold:** Dispenser 2-3 dræber OptiBond Universal-adhesive i en røn blandekop. Samg

IMPORTANTE: Para aplicações indiretas, use o cimento de resina NX3 sempre que não haja incidência ou que haja incidência limitada de luz. O NX3 com autopolimerização ou com polimerização dupla é compatível com o adesivo OptiBond Universal.

CONTRAINDICAÇÕES

1. Pacientes que tiverem história de reações alérgicas graves às resinas de metacrilato.
2. Capaamento pulpar direto.
3. Combinado com resinas de polimerização química ou dupla (que não seja NX3) quando há incidência insuficiente de luz.

AVISOS

Não utilize em pacientes com alergias conhecidas a metacrilato. A resina de metacrilato não polimerizada pode causar dermatite de contato e lesão à polpa. O adesivo OptiBond Universal contém acetona e é inflamável. Mantenha longe de fontes de ignição. OptiBond Universal é um líquido corrosivo. O gel Etchant é um ácido corrosivo - contém ácido fosfórico. Evitar contato com a pele, os olhos e os tecidos moles. Em caso de contato acidental com a pele ou os olhos, lave imediatamente com água. Procure orientação médica em caso de contato com os olhos. Somette-se para uso externo.

PRECAUÇÕES

Coloque o material sob refrigeração, entre 2 e 8 °C, imediatamente após recebê-lo. Frasco de adesivo OptiBond Universal deve ser fechado imediatamente após o uso. O adesivo OptiBond Universal é um material fotopolimerizável. Una vez que o material tem sido colocado no bloco de mistura, use uma mola ou manta para protegê-lo da luz ambiente.

Seringa de Gel Condicionador: Nunca use força excessiva ao empurrá-la de seringa de aplicação do condicionador, pois essa manobra poderá liberar material em excesso. Caso a seringa opere normalmente, remova-a do bloco de mistura e substitua-a por uma nova e, com a seringa feita da boca, verifique se o material está fluindo adequadamente.

Adeiso da porção coronária: Aplique o material da porção coronária de acordo com as instruções do uso do fabricante.

REAÇÕES ADVERSAS

Nenhuma conhecida.

INSTRUÇÕES DE USO

Instruções passo a passo

Restaurações diretas

Adesivo de Compósitos/Compômeros a Dentina/Esmalte

1. Prepare a cavidade. Lave bem com spray de água e sequem jatos de ar seco (não dessecar).

Para técnica de adesivo autocondicionante, omita os passos 2 e 3 e siga a partir do passo 4.

Para condicionamento seletivo de esmalte

2. A - Condicione o esmalte com um condicionador de gel de ácido fosfórico (ex: Gel Condicionador 37,5% da Kerr) por 15 segundos, em seguida enxague bem, certificando-se de que o condicionante foi removido. Próssiga para o passo 3.

Pasta Técnica de Condicionamento Total

2. B - Condicione as superfícies dentais do esmalte e dentina com um gel condicionador de ácido fosfórico (ex: Gel Condicionador 37,5% da Kerr) por 15 segundos, em seguida enxague bem, certificando-se de que o condicionante foi removido.

Próssiga para o passo 3.

3. Seque levemente com ar seco, não dessecar.

4. Agite o frasco de OptiBond Universal levemente.

Nota: Na primeira vez que usar, agite o frasco de adesivo OptiBond Universal vigorosamente por de segundos.

5. Utilização do frasco: Coloque a 2 gotas de adesivo OptiBond Universal em um bloco de mistura limpo. Recoloque a tampa imediatamente após o uso.

Extração com Unidose: Pará o uso em único paciente: Abra o dispositivo unidose e insira o pincel aplicador no recipiente, para imedecer a ponta aplicadora.

WYZKASANIA DO STOSOWANIA

Zastosowania bezpośrednie

• Rekonstrukcje ze światlowzmacniałymi materiałami kompozytowymi i komporowymi. • Wyszczepianie łybek z pozytywnym rezynatorem na bazie kompozytu/keramiki/metalu. • Uszczelnianie łybek przy rekonstrukcji z amalgamem. • Światlowzmacniały lub podwójnie światlowzmacniały materiał core build-up (zawrze-

nie się wyciąga po 3 sekundach). • Wykonywanie szkliw i powierzchni szkliwnej z wykorzystaniem żelaznego etanitu na wybranie techniki i poziomu szkliwu.

WYZKASANIA DO STOSOWANIA

Zastosowania bezpośrednie

• Rekonstrukcje ze światlowzmacniałymi materiałami kompozytowymi i komporowymi. • Wyszczepianie łybek z pozytywnym rezynatorem na bazie kompozytu/keramiki/metalu. • Uszczelnianie łybek przy rekonstrukcji z amalgamem. • Światlowzmacniały lub podwójnie światlowzmacniały materiał core build-up (zawrze-

nie się wyciąga po 3 sekundach). • Wykonywanie szkliw i powierzchni szkliwnej z wykorzystaniem żelaznego etanitu na wybranie techniki i poziomu szkliwu.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Pacjenci, których wystąpiła w przeszłości poważna reakcja alergiczna na żywice

2. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

3. Delikatne i niewielkie krople z wykryciem.

4. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

5. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

6. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

7. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

8. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

9. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

10. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

11. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

12. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

13. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

14. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

15. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

16. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

17. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

18. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

19. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

20. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

21. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

22. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

23. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

24. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

25. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

26. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

27. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

28. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

29. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

30. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

31. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

32. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

33. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

34. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

35. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

36. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

37. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

38. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

39. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

40. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

41. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

42. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

43. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

44. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

45. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

46. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

47. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

48. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

49. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

50. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

51. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

52. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

53. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

54. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

55. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

56. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

57. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

58. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

59. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

60. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

61. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

62. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

63. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

64. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

65. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

66. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

67. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

68. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

69. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

70. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

71. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

72. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

73. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

74. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

75. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

76. W przypadku jednorazowej szkotek aplikacyjnej, należy dodać ilość materiału do odbudowy zębów.

